

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn sử dụng thuốc Suxamethonium chlorid vuab 100mg

Căn cứ tờ hướng dẫn sử dụng thuốc **Suxamethonium chlorid vuab 100mg**, Khoa Dược cập nhật hướng dẫn cách sử dụng thuốc trên đến các khoa lâm sàng, các trung tâm như sau:

Thuốc Suxamethonium chlorid vuab 100mg có dạng bào chế là bột đông khô pha dung dịch tiêm/tiêm truyền.

- Tiêm tĩnh mạch: hòa tan 100 mg bột pha tiêm và pha loãng với 10 ml nước cất pha tiêm hoặc dung dịch natri clorid đẳng trương để có dung dịch nồng độ 1% (pha trong 10 ml).

- Truyền tĩnh mạch: Pha loãng hơn nữa đến nồng độ 0,1% - 0,2% (pha trong 100 ml – 50 ml) trong dung dịch glucose 5% hoặc dung dịch natri clorid 0,9%, điều chỉnh tốc độ truyền tùy theo đáp ứng của từng người bệnh. Tốc độ truyền khuyến cáo là 2,5 – 4 mg/phút.

- Tổng liều suxamethonium tiêm tĩnh mạch nhắc lại hoặc truyền tĩnh mạch liên tục không vượt quá 500 mg mỗi giờ.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Ban Giám đốc;
- Các khoa lâm sàng;
- Các TT trực thuộc;
- Lưu: VT, Dược.

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính