

Vancomycin & Hội chứng Người đỏ

Hướng dẫn pha truyền an toàn

Nhận diện Hội chứng người đỏ (RMS)



RMS là phản ứng dạng phản vệ xuất hiện do sự mất hạt của các tế bào mast và bạch cầu ưa base dẫn đến giải phóng histamin độc lập với kháng thể IgE hình thành trước đó hoặc con đường bổ thể



Thời điểm xuất hiện
Có thể xuất hiện 4-10 phút sau khi bắt đầu truyền hoặc có thể xuất hiện sớm sau khi truyền xong thuốc

Quy trình pha truyền và xử trí an toàn



Thông số kỹ thuật then chốt



Nồng độ pha loãng $\leq 5\text{mg/ml}$



Tốc độ truyền tối đa $\leq 10\text{mg/phút}$



Thời gian truyền ít nhất 60 phút (nên truyền trong 2 giờ với liều 1g)



Xử trí ngay khi có dấu hiệu

Nguồn :

1. Trung tâm DI & ADR Quốc gia. (2015). Vancomycin và hội chứng người đỏ. Bản tin Cảnh giác Dược. <https://magazine.canhgiacdauoc.org.vn/Magazine/Details/144>
2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Vancomycin