

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn cách sử dụng kháng sinh Levofloxacin

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, Lãnh đạo Bệnh viện đề nghị tuân thủ hướng dẫn cách sử dụng thuốc tiêm truyền chứa hoạt chất Levofloxacin như sau:

- Dung dịch tiêm truyền chứa hoạt chất Levofloxacin chỉ được dùng bằng cách **truyền tĩnh mạch chậm.**

- Thời gian truyền phụ thuộc vào liều lượng thuốc:

+ **Liều 250 mg hoặc 500 mg thường truyền trong ít nhất 60 phút.**

+ **Liều 750 mg truyền trong ít nhất 90 phút.**

Tài liệu tham khảo:

1. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Levofloxacin 750mg/150ml, cơ sở sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Imexpharm – Bình Dương – Việt Nam.

2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Levofloxacin COOPER 500mg/100ml, cơ sở sản xuất: COOPER S.A. Pharmaceuticals – Hy Lạp.

3. Dược thư quốc gia Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 23/12/2022 của Bộ Y tế.

Đề nghị các khoa, trung tâm nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Ban Giám đốc (để b/c);
- Các khoa, trung tâm;
- Lưu: VT, Dược.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Duy Thanh